

Online-Kurs Impfungen bei Krebs

Impfungen während und kurz nach der Chemo

Während einer Chemotherapie darf nicht alles geimpft werden und auch nach Ende der Krebstherapie muss unter Umständen abgewartet werden bis bestimmte Impfungen erfolgen können. Hier finden Sie eine Auflistung aller Totimpfstoffe, die während und kurz nach der Chemotherapie durchgeführt werden können. Die Bemerkungen erklären, ob beispielsweise eine Kontrolle des Antikörperspiegels – Titerkontrolle – durchgeführt werden sollte.

Impfungen	Während Chemo	Bemerkung	≥3 Mo nach Chemo	Bemerkung
Diphterie, Tetanus, Pertussis, Polio	möglich zwischen Zyklen	Titerkontrollen	empfohlen	Titerkontrollen
Influenza (IIV)	empfohlen in Saison	am Beginn der Chemo	routinemäßig	2xige Applikation (siehe Impfplan)
Pneumokokken (PCV13/PPV23)	möglich	Bevorzugt 2 Wo vor Chemo	empfohlen	kein Titer möglich
HIB-Haemophilus influenza Typ B (HIB)	möglich	bes. Kinder mit hämatolog. Malignomen, 2 Wo vor Therapie beginn	empfohlen	Kinder, Lungenkrebs kein Titer möglich
Meningokokken (Men ACWY, Men B)	möglich		empfohlen	lt. Impfplan f. Risikopat kein Titer möglich
Hepatitis A/B	möglich	Titer	empfohlen	
HPV	keine Daten		empfohlen	lt. Impfplan
FSME	keine Daten	vor Chemo	empfohlen	Titerkontrolle
Herpes Zoster (inaktiviert)	keine Daten	vor Chemo	empfohlen	eventuell Titer

Modifiziert nach: Institut für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin der Medizinischen Universität Wien (Stand 2019)



Online-Kurs Impfungen bei Krebs

Impfungen nach der Chemo

Nach Ende der Chemotherapie kann es etwas dauern, bis das Immunsystem wieder ausreicht, um Impfungen gut zu vertragen und aktiv Antikörper und Gedächtniszellen zu bilden. Hier finden Sie eine Auflistung welche Lebendimpfungen nach Therapieende empfohlen werden und welcher Zeitabstand eingehalten werden muss. Die Bemerkungen erklären, ob beispielsweise eine Kontrolle des Antikörperspiegels – Titerkontrolle – durchgeführt werden sollte.

Lebendimpfung	≥6 Monate	Anti-B Zell Th. ≥12 Mo	Bemerkungen
(Rotavirus)	n.a	n.a.	
Influenza (LAIV)	(nur 2-18J)	(nur 2-18J)	Alternative: 2x inaktivierter Impfstoff (IIV)
MMR	empfohlen	empfohlen	vorher Titer
Varizellen (Herpes Zoster inaktiviert)	empfohlen	empfohlen	vorher Titer keine Daten

Modifiziert nach: Institut für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin der Medizinischen Universität Wien (Stand 2019)