

Vorhofflimmern

Risiko für einen Schlaganfall bei Vorhofflimmern

Der Schlaganfall ist eine mögliche Folge von Vorhofflimmern. Um das Risiko abzuschätzen, wurde der CHA2DS2-VASc Score entwickelt.



Beantworten Sie alle Fragen mit „Ja“ oder „Nein“.

	Ja	Nein	Punkt(e)
Haben Sie Bluthochdruck?			1
Haben Sie Diabetes mellitus?			1
Leiden Sie an einer Herzinsuffizienz (Herzschwäche)?			1
Hatten Sie jemals in Ihrem Leben einen Schlaganfall?			2
Hatten oder haben Sie eine Gefäßerkrankung? (z.B. Herzinfarkt, periphere Verschlusskrankheit, Verkalkung der Bauchaorta, etc.)			1
Sind Sie eine (genetische) Frau?			1
Sind Sie zwischen 65 und 74 Jahre alt?			1
Sind Sie 75 Jahre alt oder älter?			2

Zählen Sie die Punkte der Fragen zusammen, die Sie mit „Ja“ beantwortet haben.

Wenn Sie an Vorhofflimmern leiden und 2 Punkte oder mehr erzielen, sollten Sie blutgerinnungshemmende Medikamente einnehmen, um Ihr Schlaganfallrisiko zu senken. Besprechen Sie Ihre Antworten mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt.

Modifiziert nach: Lip GY et al. Refining clinical risk stratification for predicting stroke and thromboembolism in atrial fibrillation using a novel risk factor-based approach: the euro heart survey on atrial fibrillation. Chest. 2010;137(2):263-72.